



Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale



RODENTICIDI



TIGER 5.0 PASTA

Prodotto Biocida PT 14 (Rodenticidi)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2016/00327AUT

TARGET: Topolino domestico, Ratto nero, Ratto grigio

Composizione per 100 grammi di prodotto

Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0)	0,005 g
Denatonium Benzoate	0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti q.b	100 g

Caratteristiche

TIGER 5.0 PASTA è un rodenticida pronto all'uso a base di Brodifacoum, principio attivo che agisce efficacemente contro topi e ratti con una sola ingestione. La morte dei roditori avviene normalmente tra i 3 ed i 5 giorni dopo la prima ingestione permettendo il controllo dell'infestazione, senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri componenti della colonia. L'esca rodenticida TIGER 5.0 PASTA è caratterizzata da una miscela di componenti di origine alimentare che risulta essere appetibile per le specie sopra indicate. TIGER 5.0 PASTA contiene una sostanza amaricante (Denatonium Benzoate) atta a ridurre il rischio d'ingestione accidentale da parte dei bambini e di animali non bersaglio.

Modo d'uso

TIGER 5.0 PASTA può essere utilizzato per derattizzazioni all'interno ed intorno ad edifici civili e rurali (industrie, abitazioni, magazzini, cantine, ripostigli) e nelle stive delle navi.

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Indossare guanti adatti (EN374) durante l'applicazione del prodotto. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti adatti. L'esca deve essere inserita in un contenitore appropriato a prova di manomissione, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione da parte di bambini e di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

Prima di posizionare i contenitori che includono l'esca, procedere ad un sopralluogo dell'area per stabilire la specie di roditori, il livello e l'estensione dell'infestazione ed individuare tutti i punti di accesso, le tane, i luoghi di alimentazione, ecc. Per minimizzare l'uso di esche rodenticide, in particolare per derattizzazioni di aree sensibili (ad es. industrie alimentari e ricoveri di animali), è consigliabile l'uso preventivo di esche non avvelenate (placebo). Utilizzare una spatola per la pulizia delle esche preparate mediante cartuccia.

Imballo

Cartone da 10 Kg

Bustine da 20 gr cad

Codice

160-TIG50

ORMA SRL

Via U. Saba, 4 - 10128 Trofarello (TO) - Italia

Tel: (+39) 011 64 99 064 • Fax: (+39) 011 68 04 102 • Email: aircontrol@ormatorino.it

Site Web: www.ormatorino.com • P.IVA: 10631670014



Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale



RODENTICIDI



Note

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza. Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti e le carcasse devono essere adeguatamente smaltite.

Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. In ogni caso le carcasse non devono essere gettate nei rifiuti o nelle discariche. Terminata la disinfestazione smaltire le esche residue secondo la normativa vigente. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 5 settimane.

Alla fine del trattamento togliere i contenitori e smaltire le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Infestazioni da ratti (*Rattus norvegicus*):

- 90 g di esca in busta dose singolarmente confezionata ogni 10 metri, riducendo la distanza a 5 metri in caso di forti infestazioni.
- per esca confezionata in vaschetta, contenitore esca pre-dosato o cartuccia, utilizzare fino a 100 g ogni 10 metri, riducendo la distanza a 5 metri in caso di forti infestazioni.

Infestazioni da topi (*Mus musculus*):

- 50 g di esca in busta dose singolarmente confezionata ogni 5 metri, riducendo la distanza a 2 metri in caso di forti infestazioni.
- per esca confezionata in vaschetta, contenitore esca pre-dosato o cartuccia, utilizzare fino a 50 g ogni 5 metri, riducendo la distanza a 2 metri in caso di forti infestazioni.

ORMA SRL

Via U. Saba, 4 - 10128 Trofarello (TO) - Italia

Tel: (+39) 011 64 99 064 • Fax: (+39) 011 68 04 102 • Email: aircontrol@ormatorino.it

Site Web: www.ormatorino.com • P.IVA: 10631670014